

## **CAPTEUR FREESTYLE LIBRE 2 :**

- ◆ Pour l'autosurveillance de la glycémie des personnes diabétiques de 4 ans ou plus.

À l'instauration du traitement, la personne :

- de moins de 18 ans doit être atteinte du diabète de type 1;
- de 18 ans ou plus doit être traitée par insulinothérapie intensive (traitement par pompe à insuline ou  $\geq 3$  injections d'insuline par jour) et doit satisfaire à un ou plusieurs de ces critères :
  - non-atteinte de la valeur d'hémoglobine glyquée (HbA<sub>1c</sub>) adaptée au patient, en dépit d'une prise en charge optimale de la maladie;
  - épisodes fréquents d'hypoglycémie durant la dernière année, malgré l'adhésion à un plan de gestion de la glycémie;
  - inaptitude à reconnaître ou à signaler les symptômes d'hypoglycémie.

La demande initiale est autorisée pour une période de 6 mois afin d'évaluer la capacité des patients à utiliser FreeStyle Libre 2<sup>MC</sup> et à porter le capteur.

La demande de poursuite de traitement est autorisée si la personne montre une utilisation optimale de FreeStyle Libre 2<sup>MC</sup> ou FreeStyle Libre<sup>MC</sup>, soit au moins 70 % du temps.

Une réévaluation clinique annuelle par le prescripteur est recommandée afin de s'assurer que la personne utilise le capteur au moins 70 % du temps.

Source: [https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/non\\_indexes/liste\\_med\\_2024-07-04\\_fr.pdf](https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/non_indexes/liste_med_2024-07-04_fr.pdf)  
Annexe IV - 27